



FICHA TÉCNICA FUNGIGARDEN

INDICAÇÕES DE USO: Produto sistêmico, tendo como ingrediente ativo o Difenconazol, indicado para combate aos fungos mancha negra (*Diclorcarpon rosae*) e oídio (*Shapaerotheca pannosana*) em jardins residenciais.

COMPOSIÇÃO CE: Difenconazol 1,670% p/p, emulsificantes e solvente.

MODO DE USO CE: Diluir 12ml de FUNGIGARDEN CE (conteúdo do flaconete ou frasco plástico) em um 1L de água.

Aplicar com pulverizador manual spray ou regador. Gire o bico aplicador para a posição on, direcione o bico para a superfície a ser pulverizada e acione o gatilho, cobrindo com spray todas partes das plantas que apresentam os fungos, até chegar ao escorrimento da calda sobre as folhas.

Recomenda-se não aplicar nas horas mais quentes do dia.

Dosagem recomenda de aplicação do produto diluído: 2,5ml por m².



COMPOSIÇÃO SPRAY: Difenconazol 0,0167% p/p, emulsificante, cossolvente, conservante e veículo.

MODO DE USO SPRAY: FUNGIGARDEN vem pronto para uso. Para aplicar, primeiro agite a embalagem, depois gire o bico aplicador para a posição on. Direcione o bico para a superfície a ser pulverizada e acione o gatilho, cobrindo com spray todas partes das plantas que apresentam os fungos, até chegar ao escorrimento da calda sobre as folhas.

Recomenda-se não aplicar nas horas mais quentes do dia.

Dosagem recomendada: 2,5ml do produto por m².

APRESENTAÇÃO: Caixa de 288ml contendo 24 flaconetes de 12ml (caixas contendo 8 unidades) | Frascos spray 500ml (caixas contendo 12 unidades).

PRECAUÇÕES: CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DE ANIMAIS.

-Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha e aquários.

-Não aplicar em hortas e pomares.

-Não reutilizar as embalagens vazias.

-Manter o produto na embalagem original.

-Não jogue no fogo ou incinerador. Perigoso se aplicado próximo a chamas ou superfícies aquecidas.

PRIMEIROS SOCORROS:

-Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabão.

-Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância.

-Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.

-Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

-Recomenda-se o uso de luvas na aplicação e manipulação do produto.

-As embalagens vazias podem ser descartadas em lixeiras comuns.

-Conservar o produto sempre na sua embalagem original em local seco, ventilado e temperatura ambiente.

DESCARTE: As embalagens vazias podem ser descartadas em lixeiras comuns. Observar as legislações estadual e

municipal específicas.

ARMAZENAMENTO: armazenar em temperatura ambiente, protegido do sol e calor e evitando o acesso crianças.

INTERVALO DE APLICAÇÃO:

Em caso de necessidade, reaplicar 30 dias após a primeira aplicação.

QUÍMICO RESPONSÁVEL:

Antônio Roldão de Souza
CRQ 04420073-IV Reg.

REGISTRO NO M.S:

3.5685.0041.001-9 (CE)

3.5685.0040.001-3 (Spray)

INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: Triazol.

Nome Comum: Difenconazol.

Antídoto/Tratamento: Não há tratamento específico.

Tratamento sintomático.

Telefone de Emergência: (16) 3663-2221

Disque-Intoxicação Anvisa / Renaciat: 08007226001

