

interfina®

FICHA TÉCNICA TIAMOXAM 750 WG

INDICAÇÕES DE USO: TIAMOXAM 750 WG, é um inseticida à base de Tiametoxam, na formulação WG, eficaz em baixas doses contra cupins subterrâneos (*Coptotermes gestroi*) e formigas (*Monomorium pharaonis*).

COMPOSIÇÃO: Tiametoxam 75% p/p, umectante, emoliente, aglutinante, emulsificante, adjuvantes, quelante e inerte..

MODO DE USAR E DOSAGEM:

Cupins subterrâneos: Diluir 7g do produto em 10L de água e aplicar com equipamento adequado nas superfícies infestadas na proporção de 50ml da calda/m².

Para uso em barreiras químicas aplicar a calda na mesma dosagem, em perfurações ou valetas ao longo dos alicerces de construções, utilizando aproximadamente 2,5L de calda por metro linear.

Formigas: Diluir 7g do produto em 10L de água e aplicar 50ml da calda/m². Aplicar com pulverizador manual ou motorizado, diretamente nas formigas ou nos locais onde transitam ou se abrigam.

Intervalo de aplicação: Nas indicações acima, se necessário após 30 dias reaplique o produto.

APRESENTAÇÃO: Pacotes de 500g (caixas contendo 4 ou 40 unidades) | Pacotes de 1kg (caixas contendo 2 ou 20 unidades).



PRECAUÇÕES:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO, OU ABSORSÃO PELA PELE.

- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.
- Não fumar ou comer durante a aplicação.
- Manter o produto na embalagem original.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos.
- Durante a manipulação, preparação da calda ou aplicação, usar macacão com mangas compridas, botas, luvas de borracha e máscara facial.
- Manusear o produto em local arejado.

PRIMEIROS SOCORROS:

- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.
- Período de reentrada: Recomenda-se não permitir a entrada de animais e pessoas nas áreas desinfestadas antes de 6 horas após a aplicação.

DESCARTE:

- Antes do descarte da embalagem vazia, faça a tríplex lavagem e adicione a água da lavagem ao produto a ser utilizado no controle das pragas.
- Inutilizar as embalagens, perfurando o fundo, antes da devolução.
- Método preferencial de descarte: as embalagens vazias devem ser devolvidas aos estabelecimentos onde foram adquiridas ou em postos / centrais de recebimento conveniados.
- Observar as legislações estadual e municipal específicas.

MODO DE ELIMINAÇÃO E DESATIVAÇÃO DO PRODUTO TÓXICO EM CASO DE DERRAMAMENTO:

- isole e sinalize a área contaminada;
- recolha o material com auxílio de pá e coloque em recipiente lacrado e identificado;

- contate a empresa registrante.
- Evite o escoamento do produto para cursos d'água.
- Remover para área de descarte de lixo e posterior incineração.

RECOMENDAÇÕES:

- Não aplicar o produto em animais domésticos, somente nas superfícies infestadas.
- Recomenda-se evitar o uso em carpetes e tapetes, devido à possibilidade de acúmulo de poeiras, resultante de aplicações frequentes e dificuldade de remoção, aumentando a exposição.

INTERVALO DE APLICAÇÃO:

Em caso de necessidade, reaplicar 30 dias após a primeira aplicação.

CONSERVAÇÃO/ARMAZENAMENTO:

Conserve o produto em local seco, ventilado, coberto, ao abrigo da luz solar e do calor excessivo.

QUÍMICO RESPONSÁVEL:

Antônio Roldão de Souza
CRQ 04420073-IV Reg.

REGISTRO NO M.S:

3.5685.0048.001-7

INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: Neonicotinóide
Nome Comum: Tiametoxam
Antídoto/Tratamento: Não há tratamento específico. Tratamento sintomático.
Telefone de Emergência: (16) 3663-2221
Disque-intoxicação Anvisa / Renaciat: 08007226001