



FICHA TÉCNICA INSETILAR FORMIGA

INDICAÇÕES DE USO: INSETILAR GEL FORMIGA é um inseticida em gel, indicado para o combate das formigas.

COMPOSIÇÃO: Fipronil 0,05 % p/p, benzoato de denatonium 0,0002 % p/p (desnaturante); atrativos, conservante e solvente.

MODO DE USO E DOSE: INSETILAR GEL FORMIGA - vem pronto para uso, em seringa plástica contendo 10g. Para aplicar basta destampar a seringa e pressionar o embolo depositando pequenos filetes próximos aos abrigos e/ou locais frequentados pelas formigas.

Dosagem: 0,03 g/m².

Onde aplicar o produto: Cozinhas, banheiros, porões, dispensas, garagens etc. Procure aplicá-lo em frestas, fendas, rachaduras, cantos de paredes, embaixo ou atrás de fogões, freezers, geladeiras, dentro dos gabinetes das pias, dentro ou embaixo de armários e outros móveis etc.

Obs.: Não aplicar concomitantemente com pulverizações líquidas convencionais.

APRESENTAÇÃO: Caixas contendo 1 seringa de 10g (caixas contendo 12 unidades).

PRECAUÇÕES: CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, OU ABSORÇÃO PELA PELE. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais domésticos. Não há restrições quanto à reentrada após a aplicação do produto.

PRIMEIROS SOCORROS: Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.

ELIMINAÇÃO E DESCARTE: Os restos das iscas podem ser removidos com o uso de detergente e descartados em lixeiras comuns assim como as embalagens vazias. Observar legislação estadual e municipal específica.

ARMAZENAMENTO: armazenar em temperatura ambiente, protegido do sol e calor e evitando o acesso crianças.

INTERVALO DE APLICAÇÃO:

Em caso de necessidade, reaplicar 30 dias após a primeira aplicação.

QUÍMICO RESPONSÁVEL:

Antônio Roldão de Souza
CRQ 04420073-IV Reg.

REGISTRO NO M.S:

3.5685.0025.001-1

INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: Fenil Pirazol

Nome Comum: Fipronil

Antídoto/Tratamento: Não há tratamento específico.

Tratamento sintomático.

Telefone de Emergência: (16) 3663-2221

Centro de Informações Tóxicológicas: 0800-0148110