

FICHA TÉCNICA ROÇADA GARDEN

INDICAÇÕES DE USO: Roçada é um herbicida sistêmico seletivo, concentrado solúvel em apresentação dose única, indicado para o combate a plantas daninhas como: picão preto (*Bidens pilosa*), picão branco (*Ganlinsoga parviflora*) e tiririca (*Cyperus rotundus*) para aplicação em jardins residenciais e em gramados, sem prejudicar as demais plantas ornamentais do jardim.

COMPOSIÇÃO: Imazapir 10,0% p/p, cossolvente, umectante e veículo.

MODO DE USAR E DOSAGEM:

Diluir 1,5ml (conteúdo do flaconete) em um 1L de água. Aplicar com pulverizador manual spray ou regador. Em caso de pulverizador com gatilho, agite a embalagem, depois gire o bico aplicador para a posição on. Direcione o bico para a superfície a ser pulverizada e acione o gatilho, cobrindo com spray as plantas daninhas indesejáveis. O conteúdo de uma embalagem aplicadora contendo um litro dá para cobrir uma área de 30m².

APRESENTAÇÃO: Caixas de 15ml contendo 10 flaconetes de 1,5ml (caixas contendo 16 unidades).



PRECAUÇÕES:

CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DE ANIMAIS.

CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DE ANIMAIS.

-Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha e aquários.

-Não aplicar em hortas e pomares.

-Não reutilizar as embalagens vazias.

-Manter o produto na embalagem original.

-Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais.

PRIMEIROS SOCORROS:

-Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água e sabão.

-Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância.

-Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.

-Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

-Recomenda-se o uso de luvas aplicação e manipulação do produto.

-As embalagens vazias podem ser descartadas em lixeiras comuns.

-Conservar o produto sempre na sua embalagem original em local seco, ventilado e temperatura ambiente.

RECOMENDAÇÕES:

- Não aplicar nas horas mais quentes do dia para evitar dispersão indesejada das microgotas.

- Aplicar somente nas plantas que deseja eliminar

- Evitar deriva sobre plantas úteis.

- Usar a calda imediatamente após a sua preparação.

INTERVALO DE APLICAÇÃO:

Em caso de necessidade, reaplicar o produto 30 dias após a primeira aplicação.

CONSERVAÇÃO/ARMAZENAMENTO:

Conserve o produto em local seco, ventilado, coberto, ao abrigo da luz solar e do calor excessivo.

QUÍMICO RESPONSÁVEL:

Antônio Roldão de Souza
CRQ 04420073-IV Reg.

REGISTRO NO M.S:

3.5685.0039.001-8

INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: Imidazolinona

Nome Comum: Imazapir

Antídoto/Tratamento: Anti-histamínicos e tratamento sintomático.

Telefone de Emergência: (16) 3663-2221

Disque-Intoxicação Anvisa / Renaciat: 08007226001